

Recommandation selon l'ANSM 2011

Adulte

1^{ÈRE} INTENTION

- Amoxicilline* : 2g/jour en 2 prises ,
ou
 - Clindamycine* : 1200 mg/jour en 2 prises,
ou
 - Azithromycine 500 mg/jour en 1 prise,
ou
 - Clarithromycine 1000 mg/jour en 2 prises,
ou
 - Spiramycine 9 MUI/jour en 3 prises.
-
- Doxycycline 200 mg/jour en 1 prise (midi ou soir)
pour les parodontites agressives localisées

2^{DE} INTENTION

- Amoxicilline-acide clavulanique 2-3g/jour en 2-3 prises
ou
 - Métronidazole 1500 mg/jour en 3 prises,
associé à Amoxicilline 2g/jour en 2 prises,
ou Azithromycine 500 mg/jour en 1 prise,
ou Clarithromycine 1g/jour en 2 prises,
ou Spiramycine 9 MUI/jour en 3 prises
-
- Pristinamycine 2 g/jour en 2 prises
pour la sinusite maxillaire aigüe d'origine dentaire.

Enfant

1^{ÈRE} INTENTION

- Amoxicilline* : 50 à 100 mg/kg/jour en 2 prises,
ou
- Spiramycine : 300 000 UI/kg/jour en 3 prises,
ou
- Clindamycine* : 25 mg/kg/jour en 3 ou 4 prises,
ou
- Azithromycine (hors AMM) : 20mg/kg/jour en 1 prise,
ou
- Clarithromycine (hors AMM) : 15 mg/kg/jour en 2 prises.

2^{DE} INTENTION

- Amoxicilline-acide clavulanique 80mg/kg/jour en 3 prises
ou
- Métronidazole 30 mg/kg/j en 2-3 prises
associé à Amoxicilline 50 à 100 mg/kg/jour en 2 prises,
ou Azithromycine 20 mg/kg/jour en 1 prise,
ou Clarithromycine 15 mg/kg/jour en 2 prises,
ou Spiramycine 300 000 UI/kg/jour en 3 prises.

Durée des traitements : 7 jours
sauf azithromycine : 3 jours

* Molécules recommandées par l'ANSM en prophylaxie.